



กรมควบคุมโรค
กองวัณโรค

วัณโรค ระยะแฝง

รักษา ก่อน ป้องกันป่วย ช่วยลดวัณโรค



การวินิจฉัยวัณโรคระยะแฝง

1 การตรวจคัดกรองวัณโรค

โดยการซักประวัติอาการที่เข้าได้กับวัณโรค
ตรวจร่างกาย และเอกซเรย์ทรวงอก

- หากเป็นวัณโรค เข้ารับการรักษาวัณโรค
- หากไม่เป็นวัณโรค ตรวจหาการติดเชื้อวัณโรคระยะแฝง

2 การตรวจหาการติดเชื้อวัณโรค ระยะแฝง มี 2 วิธี



ทดสอบ

การติดเชื้อทางผิวหนัง (TST)



ตรวจเลือดหา

การติดเชื้อ (IGRA)

การรักษาวัณโรคระยะแฝง

ใช้เวลาในการรักษา 1 เดือน/ 3 เดือน/ 4 เดือน/ และ
6-9 เดือน ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์

กินยาครบทุกเม็ด ทุกมื้อ ไม่หยุดยาเอง
หากมีอาการแพ้ยา ควรปรึกษาแพทย์

พบแพทย์หลังการรักษาครบ (ทุก 6 เดือน จนครบ 2 ปี)



ผู้ติดเชื้อวัณโรค ที่ไม่ได้รับการรักษาควร!

ติดตามเฝ้าระวังการป่วยเป็นวัณโรค โดย สังเกตอาการป่วยวัณโรค และ
เอกซเรย์ทรวงอก ทุก 6 เดือน จนครบ 2 ปี หลังจากนั้นเอกซเรย์ทรวงอก
ทุก 1 ปี และสังเกตอาการ



รักษาสุขภาพให้แข็งแรง ออกกำลังกาย
และรับประทานอาหารครบ 5 หมู่
หากมีอาการสงสัยวัณโรค รีบไปพบแพทย์

การปฏิบัติตนเพื่อลดการป่วย และการแพร่เชื้อวัณโรค

ผู้ป่วยวัณโรค

- รับประทานยาจนครบการรักษา
- สวมหน้ากากอนามัย

ผู้ติดเชื้อวัณโรคระยะแฝง

- รักษาการติดเชื้อวัณโรคระยะแฝง และต้องรับประทานยาสม่ำเสมอ
ครบถ้วน เอกซเรย์ทรวงอก ทุก 6 เดือน จนครบ 2 ปี และสังเกต
อาการตัวเอง หากมีอาการสงสัยวัณโรค รีบไปพบแพทย์
- รักษาสุขภาพให้แข็งแรง ออกกำลังกาย และทานอาหารครบ 5 หมู่

บุคคลทั่วไป

- สวมหน้ากากอนามัย เมื่ออยู่ในที่ชุมชน
- ตรวจสุขภาพประจำปี

