




กรมควบคุมโรค
กองวัณโรค

วัณโรค ระยะแฝง


รักษาต่อเนื่อง ป้องกันป่วย ส่วนคนวัณโรค



วัณโรคระยะแฝง คือ...

การได้รับเชื้อวัณโรคจากผู้ป่วย และเกิดการติดเชื้อวัณโรคในร่างกาย
แต่ร่างกายมีภูมิคุ้มกันสามารถยับยั้งเชื้อวัณโรคได้ จึงไม่มีอาการป่วย
และไม่สามารถแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นได้

ความต่างของวัณโรคระยะแฝง และการป่วยเป็นวัณโรค



ได้รับเชื้อ ไม่ติดเชื้อ
ไม่ป่วยเป็นวัณโรค



ได้รับเชื้อ ติดเชื้อ
ไม่ป่วยเป็นวัณโรค



ได้รับเชื้อ ติดเชื้อ
ป่วยเป็นวัณโรค



ปกติ



วัณโรค
ระยะแฝง



ป่วยเป็น
วัณโรค

วัณโรคระยะแฝง

ไม่มีอาการ

ไม่สามารถ
แพร่เชื้อได้

เอกซเรย์ทรวงอก
ผลปกติ

ตรวจเสมหะ
ไม่พบเชื้อวัณโรค

วัณโรค

ไอเรื้อรังมากกว่า 2 สัปดาห์
ไอเป็นเลือด มีไข้ น้ำหนักลด
มีเหงื่อออกตอนกลางคืน

แพร่เชื้อได้
โดยเฉพาะการไอ จาม

เอกซเรย์ทรวงอก
ผิดปกติ เข้าได้กับวัณโรค

ตรวจเสมหะ
อาจพบหรือไม่พบเชื้อวัณโรค

กลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อวัณโรค



1

ผู้อยู่ร่วมบ้าน
หรือสัมผัสใกล้ชิด
ผู้ป่วยวัณโรค



- อยู่ร่วมกับผู้ป่วยวัณโรค
อย่างน้อย 8 ชั่วโมงต่อวัน
หรือ 120 ชั่วโมงต่อเดือน
- * โดยเฉพาะเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี

2

ผู้ติดเชื้อเอชไอวี



3

ผู้ที่มีความเสี่ยงอื่นๆ

- ผู้ป่วยฟอกไตเรื้อรัง
- ผู้ป่วยเตรียมปลูกถ่ายไขกระดูก
และเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ
- ผู้ป่วยที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน
- ผู้ป่วยซิลิโคซิส (โรคปอดจากฝุ่นหิน)



Facebook กองวัณโรค

เว็บไซต์ กองวัณโรค